



MEDICINA DENTÁRIA MALEFÍCIOS DOS PIERCINGS ORAIS

Os piercings na cavidade oral podem causar inflamação e infeção?

A inflamação na perfuração dos tecidos para a colocação do piercing é imediata e pode haver risco de infeção se os materiais não estiverem devidamente esterilizados, aumentando o risco de transmissão de doenças como hepatite, tétano, HIV, etc. As infeções também podem ser causadas devido à acumulação de placa bacteriana na zona do piercing, que muitas vezes é difícil de higienizar.

Que interferências com a função normal da boca podem surgir?

A utilização de piercings pode provocar inúmeras alterações e danos orais. Recessão gengival, fraturas ou desgaste dentário podem ocorrer devido ao atrito e contacto com o piercing e, em alguns casos, essa utilização pode até mesmo levar à perda de dentes.

A fonética pode também ficar alterada, dificultando a pronúncia de alguns sons. E poderá ainda existir dificuldade de mastigação, causada pela presença de um corpo estranho.

Podem causar lesões pré-cancerígenas?

Na origem de lesões pré-cancerígenas podem estar vários motivos, entre eles os metais constituintes da liga do piercing, tais como o cromo, que é considerado cancerígeno. O trauma crónico aliado a outros fatores de risco, como o tabaco e o álcool pode, ainda, potenciar este tipo de lesões.

Podem também surgir reações alérgicas?

Por vezes são encontrados casos de alergia aos materiais que constituem os piercings, nomeadamente a alguns metais, como o níquel. O alargamento da zona perfurada pode ser uma consequência dessa reação alérgica.

Este tipo de piercings pode causar problemas cardíacos?

Como consequência da perfuração na cavidade oral, existe um risco de inúmeras bactérias entrarem na circulação sanguínea, formando aglomerados que se fixam nas válvulas cardíacas. Esta presença de bactérias pode, em pessoas mais suscetíveis, causar uma endocardite infecciosa - que consiste na inflamação das válvulas e dos tecidos cardíacos.

Devo consultar o meu dentista antes de fazer um piercing oral?

A colocação de piercings na cavidade oral é desaconselhada pelos médicos dentistas. Ainda assim, quem tem intenções de o fazer deve visitar periodicamente o seu médico para um melhor acompanhamento.