



MEDICINA DENTÁRIA TRAUMATISMOS DENTÁRIOS

O que os pais devem fazer em caso de traumatismo dentário?

Acalme a criança e lave a boca com água corrente se houver sangue. Observe com atenção: veja se falta algum dente, se algum dente está partido, rachado ou a abanar. Esteja atento a pequenas diferenças por mais irrelevantes que possam parecer. De seguida, dirija-se à MALO CLINIC mais perto de si, o mais cedo possível.

A MALO CLINIC marca presença a nível nacional, tem a especialidade de Odontopediatria e serviço de urgências (<https://maloclinics.com/clinicas-nacionais>).

O que o médico dentista irá fazer?

É muito importante que os pais relatem o maior número de detalhes possível sobre o incidente: há quanto tempo aconteceu, onde, como e que alterações verificaram quando observaram a criança. Com estas informações e uma observação clínica mais detalhada, o médico dentista vai conseguir perceber se houve algum traumatismo que não está visível a “olho nu”, nomeadamente lesões na estrutura óssea ou dentária e proceder ao tratamento mais adequado.

As lesões nos dentes de leite são graves?

As lesões nos dentes de leite podem ter consequências diretas nos dentes definitivos.

O que fazer se o dente definitivo cair?

1. Procure o dente.
2. Segure-o pela coroa (parte branca) evitando tocar na raiz.
3. Se o dente estiver sujo, lave-o por 10 seg. em água corrente ou soro.
4. Coloque o dente de volta no seu lugar.
5. Se tal não for possível: Coloque-o num copo com soro ou leite ou coloque-o na boca entre a bochecha e a gengiva (caso se trate de uma criança pequena, é preferível colocar o dente num recipiente com leite ou soro, para que a criança não engula o dente).
6. Dirija-se à MALO CLINIC, o mais rapidamente possível, idealmente nos primeiros 60 minutos.

O que fazer se o dente partir?

1. Procurar o pedaço/fragmento do dente.
2. Coloque-o num copo com soro ou leite ou coloque-o na boca entre a bochecha e a gengiva pois o fragmento do dente pode ser recolocado.
3. Dirija-se à MALO CLINIC, o mais rapidamente possível, idealmente nos primeiros 60 minutos.